

РЕЕСТРАЦІЯ КОЛЕКЦІЙ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН В УКРАЇНІ

Свідоцтво № 356 **ярий ячмінь (*Hordeum vulgare* L.)***Тип колекції:* ознакова за цінними господарськими ознаками

Кількість зразків у колекції: 51, що походять з 13 країн, згруповані за 16 ознаками та 64 рівнями їх прояву: висота рослини, стійкість до вилягання, урожайність, стійкість до борошнистої роси, стійкість до темно-бурої плямистості, стійкість до сітчастої плямистості, стійкість до смугастої плямистості, стійкість до карликової іржі, вегетаційний період (сходи — колосіння), довжина колоса, кількість зернин з колоса, маса зерна з колоса, маса зерна з рослини, маса 1000 зернин, вміст білка, стійкість до посухи. *Заявник:* Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН. *Автори:* Демидов О. А., Поліщук Т. П., Кузьменко Є. А. Запит №000520. Дата пріоритету 12.12.2025.

Свідоцтво № 357 **ярий ячмінь (*Hordeum vulgare* L.)***Тип колекції:* робоча за врожайністю

Кількість зразків у колекції: 26, що походять з 5 країн, згруповані за 8 ознаками та 21 рівнем їх прояву: урожайність, маса 1000 зернин, стійкість до сітчастого гелмінтоспоріозу, висота рослин, довжина колоса, кількість зернин в колосі, маса зерна з колоса, вегетаційний період. *Заявник:* Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН. *Автори:* Вискуб Р. С., Вінюков Г. А., Ліхушина Г. А., Тімченко К. А., Ващенко В. В. Запит №000522. Дата пріоритету 17.12.2025.

Свідоцтво № 355 **кукурудза *Zea mays* L.: розлусна (subsp. *evarta* Sturt.), кремениста (subsp. *indurata* Sturt.); зубувата (subsp. *indentata* Sturt.), напівзубувата (subsp. *semindentata* Kulesh.); воскувата (*ceratina* Kulesch.), крохмалиста (*amylacea* Sturt.), цукрова (subsp. *sacharata* (Koern.) Zhuk.)**

Тип колекції: ознакова за посухостійкістю рослин у фазі проростків

Кількість зразків у колекції: 244, що походять з 25 країн, згруповані за 34 ознаками та 135 рівнями їх прояву: посухостійкість рослин у фазі проростків, посухостійкість зразка (комплексна оцінка), група стиглості зерна, висота основного стебла, висота прикріплення верхнього качана, кількість листків, довжина волоті, кількість бічних галузок на волоті, тип волоті, довжина верхньої галузки волоті, довжина меживузля під волоттю, забарвлення колоскових лусок волоті, забарвлення пиляків, пилкоутворююча здатність, довжина качана, діаметр качана в середній частині, кількість рядів зернин на качані, кількість зернин в ряду, кількість зернин на качані, продуктивність рослини, вихід зерна, маса 1000 зернин, кількість качанів на рослині, озерненість верхівки качана, довжина ніжки качана, забарвлення стовпчиків, довжина зернини, ширина зернини, інтенсивність росту, інтенсивність накопичення сухих речовин в зерні, ширина листкової пластини над качаном, довжина листкової пластинки над качаном, кількість листків над качаном, забарвлення стрижня. *Заявник:* Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН. *Автори:* Харченко Ю. В., Харченко Л. Я., Роговий О. Ю., Кузьмишина Н. В., Вакуленко С. М. Запит №000511. Дата пріоритету 23.10.2025.

Свідоцтво № 358 абрикос (*Prunus armeniaca* L.)

Тип колекції: спеціальна за характеристикою плодів

Кількість зразків у колекції: 40, що походять з 5 країн, згруповані за 16 ознаками та 74 рівнями їх прояву: сила росту дерева, габітус дерева, ступінь галуження дерева, час початку цвітіння, час початку достигання, розмір плоду, форма плоду (вигляд з черевця), опушення, основне забарвлення шкірки, забарвлення м'якуша, текстура м'якуша, твердість м'якуша, зростання кісточки з м'якушем, форма кісточки (вигляд з боку), продуктивність, рівень урожайності. *Заявник:* Дослідна станція помології ім. Л. П. Симиренка Інституту садівництва НААН. *Автори:* Юрик Л. С., Буркут М. В. Запит №000510. Дата пріоритету 23.10.2025.

Свідоцтво № 354 ехінацея (*Echinacea* Moench.): ехінацея пурпурова (*E. purpurea* (L.) Moench.), ехінацея бліда (*Echinacea pallida* (Nutt.) Nutt.), ехінацея вузьколиста (*Echinacea angustifolia* DC.)

Тип колекції: ознакова

Кількість зразків у колекції: 25, що походять з 8 країн, згруповані за 14 ознаками та 70 рівнями їх прояву: продуктивність надземної маси, підземної маси, насіння, висота рослин у фазу цвітіння, кількість генеративних пагонів, діаметр суцвіття, стійкість до вірусних хіороб: огіркова мозаїка (зб. *Cucumber mosaic virus*), плямистості листя: церкоспороз (зб. *Cercospora rudbeckii* Peck), філостиктоз (зб. *Phyllosticta* sp.), кореневих гнилей: фузаріозна коренева гниль (зб. *Fusarium oxysporum* Schitdl, *Fusarium gybbosum* Appel & Wollenw), сисних комах: трав'яний клоп (*Lygus rugulipennis* Popp.), пістрява цикада (*Eupteryx atropunctata* Goeze.), жовтувата цикада (*Empoasca flavescens* F.), багатоїдних комах: озима совка (*Agrotis segetum* Schiff.), оклична совка (*Agrotis exclamationis* L.), звичайний буряковий довгоносик (*Bothynoderes punctiventris* Germ.), сірий буряковий довгоносик (*Tanymecus palliatus* F.), вміст кафтарової кислоти в коренях і кореневищах, цикорієвої кислоти в коренях і кореневищах, Σ кафтарової і цикорієвої кислоти в коренях і кореневищах. *Заявник:* Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроєології і природокористування НААН. *Автори:* Колосович М. П., Шевченко Т. Л. Запит №000515. Дата пріоритету 27.10.2025.